

- **Un bruit interne élevé et un mauvais filtrage du bruit externe caractérisent la perception dans le "trouble du spectre de l'autisme"**
- **Évaluation du risque de biais dans les essais contrôlés randomisés pour le "trouble du spectre de l'autisme"**
- **L'autisme et l'hébergement dans l'enseignement supérieur: le point de vue de la communauté de l'autisme**
- **Propriétés psychométriques de la version espagnole du questionnaire sur le phénotype élargi de l'autisme: forces, faiblesses et améliorations futures**
- **Le refus alimentaire chez les enfants autistes est-il lié au génotype TAS2R38?**
- **Utilité d'une version abrégée des échelles d'intelligence stanford-binet (5e éd.) dans l'estimation du QI à «échelle complète» pour les jeunes enfants avec un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme"**
- **L'effet de la thérapie d'intégration sensorielle sur la performance professionnelle chez les enfants autistes**
- **La phytothérapie comme un traitement alternatif dans le "trouble du spectre de l'autisme" : une revue systématique**

Un bruit interne élevé et un mauvais filtrage du bruit externe caractérisent la perception dans le "trouble du spectre de l'autisme"

Posted: 30 Dec 2017 12:50 AM PST

Aperçu: G.M. Une hypothèse émergente postule que le bruit interne est un facteur clé influençant les capacités perceptives dans les "troubles du spectre de l'autisme"(TSA). Étant donné les effets fondamentaux et inévitables du bruit sur presque tous les aspects du traitement neural, il pourrait s'agir d'une anomalie critique ayant de vastes répercussions sur la perception, le

Évaluation du risque de biais dans les essais contrôlés randomisés pour le "trouble du spectre de l'autisme"

Posted: 30 Dec 2017 12:39 AM PST

Aperçu: G.M. L'objectif de la recherche était de déterminer les indicateurs de validité et de fiabilité de construction de l'outil Cochrane de risque de biais (RoB) dans le contexte des essais cliniques randomisés (ECR) sur les "troubles du spectre de l'autisme" (TSA).L'analyse factorielle confirmatoire a été utilisée pour évaluer un modèle unidimensionnel composé de 9 indicateurs

L'autisme et l'hébergement dans l'enseignement supérieur: le point de vue de la communauté de l'autisme

Posted: 30 Dec 2017 12:34 AM PST

Aperçu: G.M. Cet article s'appuie sur le corpus croissant de recherches sur l'enseignement supérieur pour les étudiants autistes en sollicitant la contribution d'adultes autistes sur leurs expériences d'enseignement supérieur et des suggestions pour rendre ces expériences plus «autism- friendly». Soixante-six personnes ont participé à un sondage exploratoire national et trente et une

Propriétés psychométriques de la version espagnole du questionnaire sur le phénotype élargie de l'autisme: forces, faiblesses et améliorations futures

Posted: 30 Dec 2017 12:27 AM PST

Aperçu: G.M. Le phénotype élargi de l'autisme (BAP) se réfère à un ensemble de caractéristiques comportementales subcliniques qualitativement similaires à celles présentées dans les "troubles du spectre de l'autisme" (TSA). Le questionnaire BAP (BAPQ) a été largement utilisé pour évaluer le BAP à la fois dans les familles des personnes autistes et dans la population générale. La

Le refus alimentaire chez les enfants autistes est-il lié au génotype TAS2R38?

Posted: 30 Dec 2017 12:20 AM PST

Aperçu: G.M. Une variation du gène TAS2R38, associée à une sensibilité au goût amer, peut provoquer une perception différente de certains aliments. En particulier, certains enfants sont hypersensibles à l'amertume et montrent un répertoire plus restreint d'aliments acceptés. Nous évaluons la sensibilité amère chez les enfants avec diagnostic de TSA avec ou sans sélectivité alimentaire, à

Utilité d'une version abrégée des échelles d'intelligence stanford-binet (5e éd.) dans l'estimation du QI à «échelle complète» pour les jeunes enfants avec un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme"

Posted: 30 Dec 2017 12:15 AM PST

Aperçu: G.M. La cinquième édition des échelles d'intelligence de Stanford-Binet permet d'estimer le QI «à pleine échelle» (FSIQ) en utilisant une version abrégée du test - le QI abrégé de la batterie (ABIQ). Dans le cadre d'un service d'équipe d'intervention précoce publique, l'étude transversale actuelle a étudié l'utilité de l'ABIQ pour estimer la FSIQ chez 40 enfants avec un diagnostic

L'effet de la thérapie d'intégration sensorielle sur la performance professionnelle chez les enfants autistes

Posted: 29 Dec 2017 11:57 PM PST

Aperçu: G.M. Les problèmes de traitement sensoriel et les dysfonctionnements associés sont parmi les conditions les plus courantes chez les enfants avec un diagnostic de "trouble du spectre de l'autisme" (dTSA). Cette étude a examiné l'effet de la thérapie d'intégration sensorielle (SIT) sur différents aspects de la

performance professionnelle chez les enfants avec dTSA. L'étude a été

La phytothérapie comme un traitement alternatif dans le "rouble du spectre de l'autisme" : une revue systématique

Posted: 29 Dec 2017 11:51 PM PST

Aperçu: G.M. Cette revue se concentre sur l'efficacité et la sécurité des médicaments à base de plantes dans la gestion des "troubles du spectre de l'autisme" (TSA) chez les humains et les animaux. Les bases de données PubMed, Scopus, Google Scholar, Web of Science et Science Direct ont été recherchées jusqu'au 30 octobre 2016. Les termes clés utilisés étaient "ASD", "Asperger", "autisme"

You are subscribed to email updates from [Autisme Information Science](#).
To stop receiving these emails, you may [unsubscribe now](#).

Email delivery powered by Google

Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States